

ПОДГОТОВКА К МСКТ ИССЛЕДОВАНИЮ

На исследование необходимо взять с собой результаты предыдущих исследований: данные УЗИ, КТ или МРТ, медицинские документы, выписки из стационаров.

При назначении КТ исследования с внутривенным контрастированием необходимо предоставить результаты биохимического анализа крови – креатинин (мкмоль/л) – анализ действителен в течение 1 месяца.

МСКТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства проводится до рентгенологических исследований пищеварительного тракта с бариевой взвесью либо через неделю после.



МСКТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ


(печень, желчевыводящие пути, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка)

3 часа голода перед исследованием. Выпить 1500 мл негазированной воды малыми дозами в течение 40 минут перед исследованием (необходимо для контрастирования кишечника). Допустимо: чай, вода, если назначены лекарства, то можно принимать.



МСКТ ПОЧЕК, НАДПОЧЕЧНИКОВ И МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

3 часа голода перед исследованием. В течение 1 часа перед исследованием необходимо принять внутрь около 1000 мл воды без газа. Наполненный мочевой пузырь – не мочиться за 30 минут до назначенного времени.




МСКТ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА

3 часа голода перед исследованием. Выпить 2000 мл негазированной воды малыми дозами в течение 60 минут перед исследованием (необходимо для контрастирования кишечника). Допустимо: чай, вода, если назначены лекарства, то можно принимать.



МСКТ-ЭНТЕРОГРАФИЯ (исследование тонкой кишки)

5 часов голода перед исследованием. 1 пакет Фортранс растворяется в 2000 мл воды. Пить малыми дозами в течение 40–60 мин до начала исследования (выдается в отделение непосредственно перед исследованием). За 6–8 часов до исследования 2 таблетки НО-ШПА Форте. За 30 минут до исследования 2 таблетки НО-ШПА Форте.



МСКТ (ВИРТУАЛЬНАЯ) КОЛОНОСКОПИЯ (исследование толстой кишки)

Накануне исследования обед – последний прием пищи. С 15 часов до 20 часов прием препарата «ФОРТРАНС» 4 пакета растворяем в 4 литрах воды. Выпиваем каждые 15 минут по стакану. Утром натощак.



МСКТ КОРОНАРОГРАФИЯ (МСКТ сердца)

3 часа голода перед исследованием. В день исследования нельзя пить кофе. Накануне исследования сердца, коронарных артерий запрещен прием препаратов, стимулирующих потенцию (Силденафил (Виагра) или Тадалафис (Сиалис), Варденафил (Ливитра)).

Перед исследованием исключить употребление всех веществ, ускоряющих ритм сердца (кофеин, атропин, теофиллин, алкогольные напитки, курение). Если Вы принимаете бета-блокаторы, отмены препаратов не требуется (возьмите их с собой).

Уточните у своего лечащего врача, можно Вам принимать бета-блокаторы. При частоте сердечных сокращений более 80 ударов в минуту будет необходимо принять бета-блокатор для «урегия» сердечного ритма.

Перед введением контрастного вещества применяются нитраты (Нитролингвал-Аэрозоль, Нитроспрей, Нитро-минт, Изокет-спрей) для расширения коронарных артерий