

## ПОДГОТОВКА К РЕНТГЕНОВСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ



### ИРРИГОСКОПИЯ

За день до исследования следует полностью отказаться от продуктов, вызывающих газообразование (дрожжевая выпечка, черный хлеб, бобовые, газированные напитки, пиво и пр.).

Необходимо пить воду без газа; до 16:00 разрешается легкий ужин. Для расчета количества «Фортранса» необходимо свой вес разделить на 25 — получается необходимое количество пакетиков. Далее готовят раствор из расчета 1 пакетик на 1 л воды. Полученный раствор начинают пить с 17:00 (накануне исследования) по схеме: 1 стакан каждые 15 мин.

«Фортранс» может иметь неприятный вкус — разрешается добавлять сок лимона или апельсина.



### ПОДГОТОВКА К РЕНТГЕНОВСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ

**пищевода, желудка, 12-перстной кишки бариевой взвесью**

**Исследование проводится строго натощак.** Перед исследованиями нельзя принимать лекарства, курить и пить. Ужинать следует в промежутке от 18 до 20 часов вечера. Исключается пища, способная вызвать газообразование в кишечнике.



### ЭКСКРЕТОРНАЯ ВНУТРИВЕННАЯ УРОГРАФИЯ

За день до исследования следует полностью отказаться от продуктов, вызывающих газообразование (дрожжевая выпечка, черный хлеб, бобовые, газированные напитки, пиво и пр.). До 17:00 разрешается легкий ужин. В течение суток необходимо пить воду без газа. Накануне исследования вечером (после 18:00) делают 2 очистительные клизмы (1,5–2 л воды).

После введения воды в кишечник, необходимо 5–7 минут полежать на одном боку, поджав ноги под себя, после перевернуться на другой бок. Процедуру следует проводить до тех пор, пока вода не станет прозрачной на выходе. Утром перед исследованием — только воду. Допускается прием лекарственных средств.