

# ПОДГОТОВКА К РЕНТГЕНОВСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ



**По формуле**

Фортранс  
1 шт




С 17 часов  
1 стакан  
каждые 15 мин

## ИРРИГОСКОПИЯ

За день до исследования следует полностью отказаться от продуктов, вызывающих газообразование (дрожжевая выпечка, черный хлеб, бобовые, газированные напитки, пиво и пр.).

Необходимо пить воду без газа; до 16:00 разрешается легкий ужин. Для расчета количества «Фортранса» необходимо свой вес разделить на 25 — получается необходимое количество пакетиков. Далее готовят раствор из расчета 1 пакетик на 1 л воды. Полученный раствор начинают пить с 17:00 (накануне исследования) по схеме: 1 стакан каждые 15 мин.

«Фортранс» может иметь неприятный вкус — разрешается добавлять сок лимона или апельсина.



## ПОДГОТОВКА К РЕНТГЕНОВСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ

пищевода, желудка, 12-перстной кишки бариевой взвесью

**Исследование проводится строго натощак.** Перед исследованиями нельзя принимать лекарства, курить и пить. Ужинать следует в промежутке от 18 до 20 часов вечера. Исключается пища, способная вызвать газообразование в кишечнике.




После 18 час  
2 клизмы  
1,5–2 л воды



## ЭКСКРЕТОРНАЯ ВНУТРИВЕННАЯ УРОГРАФИЯ

За день до исследования следует полностью отказаться от продуктов, вызывающих газообразование (дрожжевая выпечка, черный хлеб, бобовые, газированные напитки, пиво и пр.). До 17:00 разрешается легкий ужин. В течение суток необходимо пить воду без газа. Накануне исследования вечером (после 18:00) делают 2 очистительные клизмы (1,5–2 л воды).

После введения воды в кишечник, необходимо 5–7 минут полежать на одном боку, поджав ноги под себя, после — перевернуться на другой бок. Процедуру следует проводить до тех пор, пока вода не станет прозрачной на выходе. Утром перед исследованием — только воду. Допускается прием лекарственных средств.