

ДАТА ПРОЦЕДУРЫ

ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ

ПРОЦЕДУРА С АНЕСТЕЗИЕЙ (уточнить)

ДА*

НЕТ

* прием жидкостей прекращается за 2-3 часа до процедуры

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ТОЛСТОЙ КИШКИ ДЛЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ОСМОТРА (перед колоноскопией, ректосигмоскопией, капсульной эндоскопией).

Уважаемый пациент, Вам предлагается проведение исследования толстой кишки путем эндоскопического осмотра. Для того, чтобы исследование прошло наиболее эффективно Вам необходимо соблюдать следующие рекомендации.



Для того чтобы Вы хорошо подготовились к исследованию, необходимо изучить и строго соблюдать бесшлаковую диету в течение 2-х дней до дня подготовки к исследованию, а также следовать всем рекомендациям по приему очищающих толстую кишку препаратов.

В день исследования НЕЛЬЗЯ принимать пищу и пить воду (за исключением препарата по подготовке).

Если исследование будет выполняться под седацией(наркозом), то при себе необходимо иметь результат электрокардиограммы сердца (ЭКГ) и клинического анализа крови, сроком не более 1 месяца.



ДЕНЬ ПЕРЕД ПРОЦЕДУРОЙ

Вы можете позавтракать (до 9ч утра, по бесшлаковой диете), затем, в течение дня должны употреблять только разрешенные жидкости
+ Фортранс® +Симетикон

Фортранс®2 литра:
1 пакетик препарата на 1 литр воды

уменьшать количество жидкости НЕЛЬЗЯ



18:00 20:00 22:00

Симетикон 30 мл
(суспензия, капли, эмульсия)

Саб Симплекс, Боботик, Эспумизан



НОЧЬ



ДЕНЬ ПРОЦЕДУРЫ

Не употреблять пищу или другие жидкости кроме лекарства.
+ Фортранс® +Симетикон

Фортранс®2 литра:
1 пакетик препарата на 1 литр воды

уменьшать количество жидкости НЕЛЬЗЯ



05:00 07:00 09:00

Симетикон 30 мл
(суспензия, капли, эмульсия)

Саб Симплекс, Боботик, Эспумизан



Раствор пить постепенно: по 1 литру в течение 1 часа, по 250 мл. каждые 15 минут. Примерно через 1 час после начала приема раствора Фортранса появится безболезненный жидкий стул.

В день исследования, утром запрещено употреблять пищу и пить, быть натощак!

Время проведения исследования при подготовке в данном режиме, утреннее-дневное (10:30-15:00).

Показатель готовности пациента к исследованию/операции в процессе применения препарата

Подготовка считается завершенной, когда стул представляет собой полупрозрачную жидкость без каловых масс



Комментарии и примечания (при необходимости заполняются врачом и пациентом)

Краткая инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата ФОРТРАНС®.

Вспомогательные вещества: натрия хлорид - 1.46 г, калия хлорид - 0.75 г, натрия гидрокарбонат - 1.68 г, натрия сульфат безводный - 5.7 г, натрия сахаринат - 0.1 г. 73.69 г - пакетики бумажные ламинированные (4) - пакеты картонные.

Клинико-фармакологическая группа: Слабительный препарат с осмотическими свойствами, применяемый для лаважа кишечника

Фармако-терапевтическая группа: Слабительное средство

Фармакологическое действие: Слабительный препарат. Макрогол 4000 представляет собой линейный полимер, который посредством водородных связей удерживает молекулы воды.

За счет этого увеличивается осмотическое давление и объем кишечного содержимого.

Электролиты, входящие в состав препарата, препятствуют нарушению водно-электролитного баланса организма.

Фармакокинетика: Макрогол 4000 не абсорбируется из ЖКТ и не подвергается метаболизму.

Клиника К+31

М Проспект Вернадского
Москва, ул. Лобачевского, 42, стр.4

К+31 Петровские ворота

М Цветной бульвар, Трубная, Чеховская
Москва, 1-й Колобовский переулок, д.4

К+31 Запад

М Молодежная
Москва, Оршанская ул., д. 16 с. 2

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭНДОСКОПИЧЕСКОМУ И РАДИОЛОГИЧЕСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ИЛИ К ХИРУРГИЧЕСКИМ ВМЕШАТЕЛЬСТВАМ, ТРЕБУЮЩИМ ОТСУТСТВИЯ СОДЕРЖИМОГО В ПРЯМОЙ КИШКЕ

Режим питания при подготовке к исследованию (бесшлаковая диета) за 2-3 дня до начала приема препарата

РАЗРЕШЕНО



Нежирные мясные бульоны без овощей (прозрачные, процеженные)



Блюда из рыбы нежирных сортов (трески, судака, окуня, щуки) в отварном или паровом виде



Сахар, мед (не в сотах), желе, сироп



Мусс (½ банана, персик, дыня)



Сыр, натуральный йогурт (без добавок и наполнителей), нежирный кефир и творог, не более 2 стаканов обезжиренного молока



Овощи: овощные отвары, картофель без кожуры



Яйца в отварном виде



Мучные изделия из обогащенной муки высшего сорта: хлеб, сдоба, бисквит, баранки/бублики без мака, простые крекеры (без добавок), вермишель, лапша



Мясо и птица нежирных сортов в отварном виде



Чай, некрепкий кофе без добавления сливок/молока, компоты без ягод, соки без мякоти



Белый (очищенный) рис, каши (овсяная, рисовая)

ЗАПРЕЩЕНО



Жирные сорта мяса, рыбы, утка, гусь



Молочные супы, крем-супы, окрошка



Все бобовые, в т.ч. горох, чечевица и др.



Все специи и острые приправы (хрен, перец, горчица, лук, хумус, чеснок), а также все приправы (соусы) с зернами, травами



Копчености, колбаски, сосиски



Йогурт с добавками, пудинг, сливки, сметана, мороженое, жирный творог



Консервы, все соленья (овощи, маринованные грибы, морские водоросли)



Все зерносодержащие продукты, черный хлеб, крупы



Алкоголь, квас, газированная вода, напитки из чернослива



Все разновидности зелени




Следует избегать красных фиолетовых жидкостей. Разрешенные продукты и жидкости не должны содержать мелкие косточки, зерна, семена, отруби



Свежие и сушеные овощи и фрукты, грибы, включая капусту и супы из капусты, изюм и ягоды, особенно с мелкими косточками

Важно: от момента последнего приема разрешенной жидкости до эндоскопии должно пройти не менее 2 часов



2-4 часа



Дополнительные рекомендации по подготовке раствором «Фортранс»

- НЕЛЬЗЯ уменьшать объем воды для приготовления раствора Фортранс® и дополнительной разрешенной жидкости
- НЕОБХОДИМО соблюдать последовательность приема раствора Фортранс® и жидкости: сначала раствор, потом — жидкость
- НЕЛЬЗЯ чередовать выпивание раствора с разрешенной прозрачной жидкостью
- При специфическом вкусовом восприятии раствора Фортранс® можно пить раствор охлажденным, через коктейльную трубочку
- НЕОБХОДИМО раствор Фортранс® выпить МЕДЛЕННО, строго в течение 50–60 минут с момента его приготовления
- НЕОБХОДИМО незамедлительно использовать раствор после вскрытия и/или его разведения водой
- Во время приема раствора рекомендуется соблюдать двигательную активность: ходить, выполнять круговые движения корпусом, наклоны в стороны, вперед-назад, приседания
- НЕОБХОДИМО при подготовке дома рассчитать соответствующий временной интервал для поездки в клинику

Примечание:

Фортранс, Эндофальк – препараты ПЭГ – безопасные и эффективные средства для подготовки толстой кишки
Разведение препаратов, рекомендуемых для подготовки:
Фортранс 2 пак – 2 л воды (см пример выше);
Эндофальк (имеет фруктовый привкус) 2 пак – 1 л воды,
Объем для подготовки толстой кишки должен соответствовать 4 л,
рекомендуется прием в раздельной дозе 2+2 л (время приема – см пример выше). Только при утренних исследованиях (до 10.00) возможно разделение дозы 3л в день накануне + 1 л (4.30–5.30 утра в день исследования).

Источники информации:

Рекомендации по подготовке толстой кишки Российского эндоскопического общества, 2017г. Председатели рабочей группы: В.В. Веселов, Е.Д. Фёдоров, Е.В. Иванова

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ СЛЕДУЕТ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ОБРАТИТСЯ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ К СПЕЦИАЛИСТУ.