

ПОДГОТОВКА К МРТ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

- **За 15 мин** до исследования необходимо подойти к администратору клиники.
- При наличии в анамнезе хирургических вмешательств с установкой в организме медицинских изделий – **ОБЯЗАТЕЛЬНО (!)** наличие медицинской документации/выписки с указанием названия операции и наименования материала, из которых сделаны медицинские изделия (возможно, паспорт изделия), либо наличие в документации фразы «противопоказаний для МРТ-исследований нет».
В противном случае Вам может быть отказано в проведении исследования.
- Предоставить результаты, диски (или ссылки) с предыдущими исследованиями КТ/МРТ/УЗИ (особенно, касающиеся исследуемой области).
- Перед исследованием необходимо снять все металлические предметы:
 - Украшения, часы, очки, ремни, пирсинг, заколки и прочее;
 - Зубные протезы, слуховые аппараты;
 - Инъекционные устройства: инсулиновые помпы, автоматические инъекторы;
 - Одежду с металлическими вставками, молниями, крючками.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ МРТ-ИССЛЕДОВАНИЯ:

- Несовместимые с МРТ кардиостимулятор, ICD (имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор), нейростимулятор;
- Ферромагнитные протезы клапанов сердца;
- Фиксирующие конструкции из медицинской стали;
- Ферромагнитные имплантаты внутреннего уха;
- Ферромагнитные клипсы на сосудах головного мозга;
- Инсулиновые помпы;
- Металлические осколки, попавшие в организм в результате травмы.



Все плюсы
сильной медицины

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ МРТ-ИССЛЕДОВАНИЯ:

- Первый триместр беременности (только по экстренным показаниям);
- Клаустрофобия;
- Невозможность сохранять неподвижное положение во время исследования;
- Можно проводить исследование через 1,5 месяца после установки:
 - кава-филтра;
 - кровоостанавливающих клипс (на сосудах легких, в брюшной полости и в тазу);
 - стентов сосудов сердца и почек;
- Наличие татуировок в зоне исследования, выполненных с помощью красителей с содержанием металлических соединений.

ОГРАНИЧЕНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ МРТ С КОНТРАСТОМ:

- Прохождение предшествующего МРТ/КТ/Рентген с контрастом менее 36ч назад, если иное не оговорено с врачом-рентгенологом;
- Наличие тяжелых аллергических реакций на контрастный препарат для МРТ; при легких формах аллергических реакций (например зуд), возможно проведение после премедикации (обязательна предварительная консультация аллерголога).
- Острая и хроническая почечная недостаточность (СКФ < 30 мл/мин);
- Беременность – только по экстренным показаниям;
- При кормлении грудью рекомендовано прекратить вскармливание на 24 ч.