

МР-ЭНТЕРОГРАФИЯ

+ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕКОМЕНДОВАНО ПРОВОДИТЬ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ДНЯ.



За 24–48 часов исключить газообразующие продукты (бобовые, капуста, виноград, молоко и кисломолочные продукты, жирная и жареная, высококалорийная пища, сдобная выпечка, газированные напитки).



За 8–10 часов не принимать пищу.

Можно пить только обычную негазированную воду.



За 3–4 часа воздержаться от курения.

За 1,5 часа до исследования явиться в клинику.



За 1 час до исследования порциями по 200–300 мл начать пить 1,5–2 литра раствора «Маннитол» (выдается на месте).



За 1 час до исследования принять 2 таблетки «Но-Шпа» 40 мг.



За 30 минут до исследования принять 1 таблетку «Бускопан» 10 мг (выдается на месте).

+ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕ РЕКОМЕНДОВАНО ПРОВОДИТЬ, ЕСЛИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 24–36 ЧАСОВ ПРОВОДИЛАСЬ ГАСТРО- И/ИЛИ КОЛОНОСКОПИЯ.



Все плюсы
сильной медицины