

МРТ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:



За 24–48 часов исключить газообразующие продукты (бобовые, капуста, виноград, молоко и кисломолочные продукты, жирная и жареная, высококалорийная пища, сдобная выпечка, газированные напитки).



За 3–4 часа не принимать пищу, воздержаться от курения.



За 1 час до исследования принять 2 таблетки «Но-Шпа» 40мг.

За 30 минут до исследования принять 1 таблетку «Бускопан» 10мг.

Опорожнение прямой кишки перед исследованием.

При отсутствии самостоятельного стула – применение микроклизмы «Микролакс» за **1–2 часа** до исследования.

ЖЕНЩИНАМ РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

(при обследовании матки/яичников):



Исследование выполняется на **7–12 день** менструального цикла.

Если проводилось диагностическое выскабливание, то исследование выполняется **через 1,5 месяца** после.

ПРИ ПРИЦЕЛЬНОМ ИССЛЕДОВАНИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ:



За 1 час до исследования выпить 500–750мл негазированной питьевой воды.

За 1 час до исследования не опорожнять мочевой пузырь.

Если проводилась цистоскопия, то исследование выполняется **через 6–7 дней** после.

+ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕ РЕКОМЕНДОВАНО ПРОВОДИТЬ, ЕСЛИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 24–36 ЧАСОВ ПРОВОДИЛАСЬ ГАСТРО- И/ИЛИ КОЛОНОСКОПИЯ.

Все плюсы
сильной медицины